

Information om Brok og Hydrocele hos børn.

(Brok og Vandbrok)

Baggrund

Brok hos børn opstår, når væske eller tarme bevæger sig fra bughulen til pungen.

I fosterlivet er der en åben forbindelse mellem bughulen og pungen, idet testiklerne vandrer fra deres primære anlæg ved nyreanlægget helt ned til pungen. Under denne vandring passerer de lyskekanalen.

Den åbne kanal i lysken lukker sig normalt i 12 til 18 måneders alderen. Hvis kanalen ikke lukkes kan der opstå brok, oftest vandbrok, hvis størrelse varierer. De er ofte små eller helt væk om morgenen for så at blive større efter fysisk aktivitet.

Symptomer

Ved lyskebrok kan der opstå smerter og brokket kan sætte sig fast i pungen / lysken. Vandbrok er ofte uden symptomer udover størrelsen.

Operation

Operation foregår i fuld bedøvelse

Ved operationen opererer man via et snit i lysken og lukker her den åbentstående kanal mellem bughulen og pungen (lukker den persisterende tunica vaginalis). Såret lukkes med sting der forsvinder af sig selv.

Trådfjernelse / kontrol

Sårene lukkes med tråde, der forsvinder af sig selv.

Efterkontrol foretages efter 3 måneder, hvor man ved almindelig undersøgelse kan kontrollere om operationen har haft resultat.

Efter operationen

Efter operationen kan der være behov for smertestillende, f.eks. i form af Panodil til børn. Det vil være en god ide at holde barnet hjemme fra daginstitution nogle dage.

Komplikationer

De første dage er der risiko for blødning, som viser sig ved hævelse og blålig misfarvning. Det forsvinder af sig selv.

Infektion er sjælden og viser sig ved feber, varme, rødme og smerter og kan kræve antibiotisk behandling. Skulle det indtræffe, er det vigtigt, at barnet kommer under hurtig og kvalificeret behandling. Du bør med det samme kontakte os på tlf. 74 30 11 30 eller søge din praktiserende læge eller vagtlæge.

NAD/CB 0508