

Information om Retentio Testis (Mangelfuld nedfald af testikel)

Baggrund

I fosterlivet vandrer stenene fra deres primære anlæg ved nyreanlægget ned i pungen. Hvis dette nedfald forstyrres, oftest pga. mangelfuld hormonpåvirkning, kan testiklerne blive liggende på det sted, hvor vandringen gik i stå. De vil oftest kunne findes liggende i lyskekanalen, men nogle gange bliver de liggende oppe i bughulen. Det kan være begge sten, der ikke kommer ned i pungen, men det kan også kun være den ene side.

Hvis ikke testiklerne er i pungen efter første leveår, vil de ikke komme ned spontant og kræver derfor operation. Risikoen, ved at testiklerne ikke er i pungen, er at det sæddannende væv tager skade og derved reduceres sædkvaliteten. Drengene med retentio testis har øget risiko for senere at udvikle kræft i testiklerne også selv om man er blevet opereret. Det er derfor væsentligt at testiklerne er i pungen, så man har mulighed for at undersøge dem.

Symptomer

I varme omgivelser vil testiklerne normalt være i pungen. De vil i kulde trække sig op i lysken. Dette er fysiologisk/normalt og kræver ikke behandling. Hvis en testikel aldrig observeres i pungen eller ikke bliver der, når man fører den derned, vil man tilbyde operation. Inden operationen skal man lokalisere stenens placering - enten ved blot at kunne føle den eller ved en ultralydsundersøgelse. Hvis man mistænker at stenen ligger i bughulen, skal der foretages en kikkertundersøgelse af bughulen i fuld bedøvelse og evt. en kikkertoperation. Dette foretages på specielle børnekirurgiske afdelinger.

Operation

Operation foregår i fuld bedøvelse. Ved operationen opererer man gennem et snit i lysken. Man frilægger testiklen og fører den ned i pungen, hvor den sys fast i en lille lomme. Hvor langt ned i pungen man kan føre stenen afhænger af hvor lange de blodforsynende kar er. Det er således ikke altid muligt at føre stenen helt ned til bunden af pungen. En testikel, der har ligget i lysken er ofte mindre end den der ligget i pungen.

Trådfjernelse/kontrol

Sårene lukkes med tråde, der forsvinder af sig selv. Efter 3 måneder vil man ved almindelig undersøgelse kontrollere, at stenen ligger hvor den blev syet fast og ikke er gledet op igen.

Komplikationer

Efter operationen kan der være behov for smertestillende, f.eks. i form af Panodil - Voltaren til børn. Det vil være en god ide at holde barnet hjemme fra daginstitution nogle dage. De første dage er der risiko for blødning, som viser sig ved hævelse og blålig misfarvning. Det forsvinder af sig selv.

Infektion er sjælden og viser sig ved feber, varme, rødme og smerter. Det kræver antibiotisk behandling. Skulle det indtræffe, er det vigtigt, at barnet kommer under hurtig, kvalificeret behandling. Du bør med det samme kontakte os på tlf. 74 30 11 30 eller søge din praktiserende læge eller vagtlæge.

NAD/CB 0508